

**Antivaricoso
Antihemorroidal**

Fleboflex[®]
Diosmina 600 mg
Comprímodos Recubiertos
Vía Oral

FORMULA

Cada comprimido recubierto contiene:

Diosmina..... 600 mg.
Excipientes..... c.s.

MECANISMO DE ACCIÓN

La Diosmina prolonga el efecto vasoconstrictor de la noradrenalina en la pared de la vena, lo que aumenta el tono venoso, y por lo tanto puede reducir la capacidad venosa, la distensibilidad y la estasis.

Esto aumenta el retorno venoso y reduce la presión venosa.

Mejora el drenaje linfático, porque aumenta la frecuencia e intensidad de las contracciones autónomas del sistema, y por el aumento del número total de capilares linfáticos funcionales.

FARMACOCINÉTICA

La absorción es rápida, desde la segunda hora después de la administración.

Se logra la concentración máxima a la quinta hora.

La distribución de baja intensidad excepto en el riñón, hígado, pulmones y especialmente en las venas cavas y las venas safenas, en las cuales los niveles de radioactividad detectados son siempre mayores en comparación con los demás tejidos examinados.

Esta fijación preferencial de la diosmina y/o sus metabolitos al nivel de las venas se incrementa hasta la novena hora y persiste durante las siguientes 96 horas.

La eliminación es esencialmente por vía urinaria (79%) pero también es fecal (11%), y biliar (2.4%) con evidencia de un ciclo entero-hepático.

Estos resultados indican que la diosmina es bien absorbida en administración por vía oral.

INDICACIONES

La Diosmina está indicado principalmente en las afecciones de la circulación venosa como: várices incipientes, úlceras varicosas, flebitis, tromboflebitis.

Síntomas asociados como pesadez y dolor de los miembros inferiores.

Calambres. Telangiectasias.

Insuficiencia venosa por atonía de las paredes (dolor y tumefacción de los miembros).

Hemorroides internas y externas.

Equimosis y manifestaciones lesiones cutáneas causadas por la fragilidad capilar.

Edemas de origen linfático o venoso.

POSOLÓGIA Y MODO DE USO

Según criterio médico.

Adultos: 1 comprimido recubierto en una sola toma, según el caso.

Episodios agudos o crisis hemorroidales: comenzar con una dosis de 4 a 6 comprimidos recubiertos al día, repartidas en 3 tomas hasta la remisión del cuadro agudo, estableciendo entonces un tratamiento de sostén de 2 comprimidos recubiertos en una sola toma al día, durante 2-3 semanas.

Dosis máxima: la dosis máxima de diosmina es de 4 g (4000 mg).

Los comprimidos se deben administrar por vía oral con un poco de líquido, preferentemente con los alimentos.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes

REACCIONES ADVERSAS

Se han reportado algunos casos de desórdenes gastrointestinales, ocasionalmente se han reportado vómitos, náuseas, diarrea. También cefalea. Estos efectos desaparecen al discontinuar el tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Crisis hemorroidal: la administración de este medicamento no elimina la necesidad de un tratamiento específico para otras enfermedades ano-rectales. Debe realizarse un examen proctológico y revisar el tratamiento en caso de persistencia de los síntomas.

Los estudios experimentales realizados en animales no han demostrado efectos teratogénicos sobre el desarrollo embriológico, perinatal o post-natal, por lo que se debe consumir durante el embarazo sólo con indicación médica y si el rango de beneficios supera de manera importante los posibles riesgos. No se recomienda su uso durante la lactancia. Si los trastornos hemorroidales no se alivian en 15 días, es indispensable la consulta al médico proctólogo, este medicamento no debe ser usado cuando: exista indicación quirúrgica perentoria, existan hemorroides prominentes en forma permanente, exista otra patología causal o de interferencia a la enfermedad hemorroidal.

RESTRICCIONES DE USO

No se administre durante el embarazo o cuando sospeche de su existencia, ni durante el período de lactancia, a menos que el balance riesgo / beneficio sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento.

INTERACCIONES

No debe administrarse simultáneamente con antiácidos o alimentos altamente alcalinos, ya que puede disminuir su absorción.

SOBREDOSIS

No se reportaron casos de sobredosis con Diosmina 600 mg. En caso de ocurrir, realizar el tratamiento sintomático. Ante la eventualidad de una ingestión accidental o en caso de sobredosis concurrir al Centro Nacional de Toxicología en Emergencias Médicas, sitio ubicado en Avda. Gral. Santos y T. Mongelós. Tel. 220 418 Asunción – Paraguay.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente (inferior a 30° C).

"Mantener fuera del alcance de los niños"

Venta Bajo Receta
Industria Paraguaya



Elaborado por **Laboratorio Pharma Industries S.A.**

Calle 1 e/ Av. Pastora Cespedes y San Antonio - San Lorenzo

Para **Promepar S.A.**

Gral. Wenceslao López N° 999. Tel: 573 -112. San Lorenzo - Paraguay

D.T.: Q.F. Myriam Cabriza de Paredes. - Reg. Prof. N° 2.837

Venta autorizada por la DINAVISIA.