

Suplemento Vitamínico

Vitamina E 1.000 U.I.

PROMEPAR®

Cápsulas Blandas
Vía Oral

FÓRMULA:

Cada cápsula blanda contiene:

Vitamina E.....1.000 U.I.

Excipientes.....c.s.

INFORMACION NUTRICIONAL

Porción: 1 cápsula			
Valor energético	Cada Cápsula contiene:	Cada 100 g contiene:	% VDR
Kcal	0	10	
Kjul	0	42	
Proteínas	0 g	19 g	
Carbohidratos	0 g	0 g	
Grasas totales	0 g	38 g	
Saturadas	0 g	16 g	
Monoinsaturadas	0 g	23 g	
Poli-insaturadas	0 g	58 g	
Trans	0 g	0,5 g	
Fibra alimentaria	0 g	0 g	
Sodio	0 g	12,7 g	
Vitaminas			
Vitamina E	0,667 g	63,681 g	667 %

USOS Y APLICACIONES:

La vitamina E, es una vitamina esencial para nuestro organismo, porque es un potente antioxidante y estimulante del sistema inmunitario. Asegura que nuestro cuerpo esté protegido de los radicales libres, que son sustancias dañinas para nuestras células, tejidos y órganos. Nuestro cuerpo por sí solo no puede producir antioxidantes, por eso resulta fundamental ingerirlos diariamente a través de una dieta equilibrada, o a través de suplementos dietarios. Entre las importantes funciones que la vitamina E realiza en el organismo, se pueden mencionar las siguientes: Fortalece la elasticidad de la piel retardando el envejecimiento y la aparición de arrugas, protegiendo a las células de los radicales libres. Protege al sistema cardiovascular y al sistema nervioso. Aumenta el rendimiento físico, especialmente en deportistas, que producen altos niveles de radicales libres. Ayuda a la formación de células rojas en la sangre. Permite el crecimiento del cabello más fuerte y sano por su efecto protector contra el estrés oxidativo. Estimula el sistema inmunitario.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

La dosis sugerida para adultos es de 1 cápsula, una vez por día. Las cápsulas deben ser ingeridas con abundante líquido sin masticar, preferentemente con las comidas. Es importante no sobrepasar la dosis recomendada para evitar la aparición de efectos adversos.

REACCIONES ADVERSAS:

La vitamina E administrada en dosis recomendadas es bien tolerada. En dosis elevadas y por períodos prolongados, puede producir dolores gastrointestinales, náuseas, diarrea, cefalea, aumento de la tendencia a hemorragias, alteraciones metabólico-hormonales (en glándula pituitaria, adrenales y tiroideas), impotencia sexual, aumento del riesgo de tromboflebitis y tromboembolia, así como elevación de los niveles séricos del colesterol y de los triglicéridos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Las vitaminas no deben ser usadas como sustitutos de una dieta equilibrada, ni es conveniente ingerir dosis mayores que las recomendadas. Las dosis elevadas de vitamina E pueden reforzar el efecto de los anticoagulantes, por lo que en los pacientes tratados con estos fármacos, será conveniente controlar los factores de la coagulación con el mayor cuidado. La vitamina E aumenta el riesgo de trombosis en pacientes predispuestos a esta enfermedad, en especial, en mujeres que consumen anticonceptivos que contienen estrógenos. No existen suficientes estudios sobre la seguridad de su uso durante el embarazo y la lactancia.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a la vitamina E o alfatocoferol, o a cualquiera de los componentes de la fórmula. La relación riesgo-beneficio se evaluará en presencia de hipoprotrombinemia por deficiencia de vitamina K, y anemia por deficiencia de hierro.

INTERACCIONES:

La vitamina E aumenta el efecto de los anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina). Grandes dosis de vitamina E pueden antagonizar a la vitamina K e inhibir la producción de protombina. La administración concomitante de estrógenos (incluidos anticonceptivos orales) puede aumentar el riesgo de trombosis. La colestiramina y el colestipol pueden interferir la absorción de vitamina E. El orlistat puede disminuir la absorción gastrointestinal de vitamina E; se debe dejar un intervalo de 2 horas, antes o después, entre la administración de orlistat y la vitamina E.

SOBREDOSIS:

Ante una eventualidad de sobredosificación, recurrir al Centro Nacional de Toxicología, Hospital del trauma Dr. Manuel Giani, Avenida Gral. Santos Teodoro S. Mongelós, Teléfono: 220.418.

CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN:

Almacenar a temperatura ambiente (inferior a 30° C). Mantener alejado del alcance de los niños. Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento, o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de embarazo, lactancia o niños, consultar a su médico antes de consumir este producto.

PRESENTACIONES:

Cajas conteniendo 20 cápsulas blandas.
Cajas conteniendo 30 cápsulas blandas.
Cajas conteniendo 100 cápsulas blandas.

Venta Libre
Industria Paraguaya



Elaborado por **Swiss Pharma Group S.A.**

Zapadores del Chaco y López de Vega - San Lorenzo.

Para **Promepar S.A.**

Gral. Wenceslao López Nº 999. Tel: 573 -112. San Lorenzo - Paraguay

D.T.: Q.F. Myriam Cabriza de Paredes. - Reg. Prof. N° 2.837

Venta autorizada por la DINAVISIA.

314286PRC-001