

XICLOVIR

ACICLOVIR 5%

Ungüento dérmico

Venta bajo receta – Industria Argentina

Fórmula: Cada 100 g de unguento dérmico contiene: Aciclovir: 5 g.
Vehículo hidrosoluble: c.s.

Acción terapéutica: Antiviral.

Posología y forma de administración: Adultos y Niños: Aplicar sobre la piel o las mucosas cada tres horas, seis veces al día, durante siete días. La cantidad a aplicar deberá ser suficiente para cubrir adecuadamente todas las lesiones. La terapia debe ser iniciada tan pronto como sea posible seguida a la aparición de los signos y síntomas de la infección por virus del grupo herpes.

Indicaciones:

- 1) Tratamiento de la infección mucocutánea inicial o recurrente producida por Herpes Simplex en pacientes inmunocomprometidos, no obstante el Aciclovir sistémico es más efectivo.
- 2) Tratamiento adjunto de las infecciones por Herpes Zoster en pacientes inmunocomprometidos que hayan comenzado tratamiento por vía sistémica con otros regímenes de tratamiento para Herpes Zoster.

Desarrollo de resistencia al Aciclovir ha sido reportado con el tratamiento prolongado en pacientes inmunocomprometidos.

Efectos adversos: Incidencia más frecuente (28% aproximadamente): dolor moderado, edema, ardor y/o pinchazos en el sitio de aplicación. Incidencia menos frecuente (4% aproximadamente): prurito. Incidencia rara (0,3% aproximadamente): rash cutáneo.

Precauciones y advertencias:

Este medicamento es para uso cutáneo exclusivo y no puede ser aplicado en los ojos.

El uso de antivirales por vía tópica puede conducir a sensibilización cutánea, resultando en reacciones de hipersensibilidad con el subsecuente uso tópico o sistémico de esta medicación.

No todos los pacientes con infecciones con virus del grupo herpes requieren tratamiento con Aciclovir tópico. **Embarazo:** Debido a que

no han sido realizados estudios bien controlados, el Aciclovir no debe ser usado durante el embarazo a menos que los beneficios para la madre superen los riesgos potenciales para el feto. **Lactancia:** No es sabido aún, si el Aciclovir usado en forma tópica es excretado en la leche materna, por lo que se recomienda tener precaución cuando este medicamento sea indicado en mujeres amamantando.

Contraindicaciones: La relación riesgo/beneficio deberá ser cuidadosamente evaluada en las siguientes condiciones: Hipersensibilidad al Aciclovir tópico. Embarazo. Lactancia.

Información para el paciente: No aplicar en los ojos. Comunique a su médico si está embarazada o amamantando. Comunique a su médico si está tomando otra medicación, sea esta recetada por un profesional o de venta libre. Verifique la fecha de vencimiento antes de ingerir un medicamento. Recuerde que un medicamento beneficioso para usted puede ser perjudicial para otra persona. No olvide comunicar a su médico si padece alguna enfermedad concomitante o si ha presentado en alguna oportunidad alergia a éste u otro medicamento. No suspenda bruscamente esta medicación a menos que sea indicado por su médico. En caso de intoxicación consulte inmediatamente a su médico o a un centro asistencial. Ante la aparición de cualquiera de los siguientes síntomas consulte a su médico: dolor, picazón, ardor y/o enrojecimiento en la zona donde se aplica este medicamento. Aplique este medicamento en la cantidad y con la periodicidad indicada por su médico. Guarde los medicamentos dentro de su envase original conservando los prospectos.

Presentación: Envase conteniendo 1 pomo con 5 g y 10 g de unguento dérmico.

Conservación: Mantener lejos del calor y la luz solar directa. Conservar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud. Certificado N° 39.482

Dr. Lazar y Cía. S.A.Q. e I.

Av. Vélez Sársfield 5855

B1606 ARI Carapachay

Directora Técnica: Daniela A. Casas, farm. y bioq.

37271/4

1-1